

von Linnaeus. 我国东北各省、内蒙和新疆普遍分布。

**北极花**(中国高等植物图鉴) 林奈花(拉汉种子植物名称), 林奈木(中国种子植物科属辞典), 北极林奈草(东北木本植物图志) 图版 27

*Linnaea borealis* Linn. Sp. Pl. 631. 1753; 郝景盛, 中国北部植物图志 3: 77, 图版 31. 1934; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 506. 1955; 中国高等植物图鉴 4: 307, 图 6027. 1975.

常绿匍匐小灌木, 高 5—10 厘米; 茎细长, 红褐色, 具稀疏短柔毛。叶圆形至倒卵形, 边缘中部以上具 1—3 对浅圆齿, 上面疏生柔毛, 下面灰白色而无毛; 叶柄长 3—4 毫米。花芳香, 总花梗状着花小枝长 6—7 厘米; 苞片狭小, 条形, 微被短柔毛; 花梗纤细, 长不超过 1 厘米; 小苞片大小不等; 萼筒近圆形, 长约 2.5 毫米, 萼筒裂片狭尖, 钻状披针形, 被短柔毛; 花冠淡红色或白色, 长约 1 厘米, 裂片卵圆形, 筒外面无毛, 内被短柔毛; 雄蕊着生于花冠筒中部以下, 花药黄色; 柱头伸出花冠外。果实近圆形, 黄色, 下垂。花、果期 7—8 月。

产黑龙江、吉林、内蒙古、河北、新疆等地。生于海拔 750—2300 米的针叶林下, 或在树干和长满苔藓的岩石上成片生长。

## 7. 蛎实属 *Kolkwitzia* Graebn.

Graebn. in Bot. Jahrb. 29: 593. 1901, et in Kew Bull. 9: 354. 1909;  
郝景盛, 中国北部植物图志 3: 8 和 14. 1934; Weberling in Blumea  
14: 332. 1966.

落叶灌木。冬芽具数对明显被柔毛的鳞片。叶对生, 具短柄, 无托叶。由贴近的两花组成的聚伞花序呈伞房状, 顶生或腋生于具叶的侧枝之顶; 苞片 2; 萼筒 5 裂; 裂片狭, 被疏柔毛, 开展; 花冠钟状, 5 裂, 裂片开展; 雄蕊 4 枚, 二强, 着生于花冠筒内, 花药内向; 相近两朵花的二萼筒相互紧贴, 其中一枚的基部着生于另一枚的中部, 幼时几已连合, 椭圆形, 密被长刚毛, 顶端各具 1 狭长的喙, 基部与小苞片贴生; 雄蕊二强, 内藏; 子房 3 室, 仅 1 室发育, 含 1 枚胚珠。两枚瘦果状核果合生, 外被刺刚毛, 各冠以宿存的萼裂片。

为我国特有的单种属。产山西、陕西、甘肃、河南、湖北及安徽等省。

**蛎实**(中国北部植物图志) 图版 28

*Kolkwitzia amabilis* Graebn. in Bot. Jahrb. 29: 593. 1901; 郝景盛, 中国北部植物图志 3: 89, 图版 37, 1934; 陈嵘, 中国树木分类学 1166. 1957; 中国高等植物图鉴 4: 301, 图 6016. 1975.

多分枝直立灌木, 高达 3 米; 幼枝红褐色, 被短柔毛及糙毛, 老枝光滑, 茎皮剥落。叶椭圆形至卵状椭圆形, 长 3—8 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 顶端尖或渐尖, 基部圆或阔楔形, 全缘, 少有浅齿状, 上面深绿色, 两面散生短毛, 脉上和边缘密被直柔毛和睫毛; 叶柄长 1—2